

## προετοιμασία εξεταζομένων στον αξονικό τομογράφο

Για την διενέργεια αξονικής τομογραφίας στην οποία θα χρησιμοποιηθεί σκιαγραφικό μέσο ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός 6 ώρες.

Σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας πρέπει να ακολουθήσει τις προηγούμενες 24 ώρες φαρμακευτική αγωγή μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του εργαστηρίου ή τον θεράποντα ιατρό.

Στις αξονικές τομογραφίες κοιλίας προτείνεται λήψη νερού (5-6 ποτήρια) λίγο πριν την εξέταση.

Στην αξονική στεφανιογραφία απαιτείται αποχή από κάπνισμα και καφεΐνη για 12 ώρες πριν την εξέταση. Επίσης σε συνεννόηση με το προσωπικό του εργαστηρίου ή τον θεράποντα ιατρό πιθανά να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή σε περιπτώσεις σημαντικής ταχυκαρδίας.

Στην αξονική κολονοσκόπηση απαιτείται προετοιμασία καθαρισμού του παχέος εντέρου με καθαρτικό τις προηγούμενες μέρες, σε συνεννόηση με το προσωπικό του εργαστηρίου ή τον θεράποντα ιατρό.

Σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας, θυρεοειδοπάθειας ή λήψη μετφορμίνης είναι απαραίτητη η συνεννόηση με το προσωπικό του εργαστηρίου.

Συστήνεται η συχνή λήψη υγρών για χρονικό διάστημα 24 ωρών μετά την εξέταση, καθώς επιτυγχάνει την ταχύτερη αποβολή του σκιαγραφικού από τον οργανισμό.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων αλλεργίας μετά την εξέταση επιβάλλεται η άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο.

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης πριν από κάθε εξέταση με χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, η εξεταζόμενη πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του εργαστηρίου.